



Primo FP è un concime specificamente formulato con un alto contenuto di fosforo e potassio, progettato per promuovere l'allegagione, in particolare nelle coltivazioni di pomodoro e melanzana. La sua formulazione bilanciata supporta lo sviluppo sano e produttivo di queste piante. Utilizzando Primo FP, gli agricoltori possono migliorare significativamente l'allegagione e la qualità delle loro coltivazioni di pomodoro e melanzana, massimizzando sia la quantità che la qualità dei raccolti.

• Fosforo

Questo nutriente è cruciale per la formazione di energia nelle piante e stimola lo sviluppo delle radici e la fioritura. Un adeguato apporto di fosforo favorisce l'allegagione, ovvero la trasformazione dei fiori in frutti, aumentando la resa delle coltivazioni di pomodoro e melanzana.

• **Potassio:** Il potassio migliora la qualità dei frutti, la resistenza alle malattie e la tolleranza allo stress idrico. In particolare, per pomodori e melanzane, il potassio aiuta a garantire frutti più grandi, saporiti e di qualità superiore.

• Promozione dell'allegagione

L'uso di Primo FP è particolarmente vantaggioso durante le fasi critiche della fioritura, aiutando a garantire un numero maggiore di frutti per pianta, essenziale per massimizzare la produzione.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale.....11%
di cui ureico.....11%
Ossido di potassio (K₂O) *solubile in acqua*...5%

Densità: 1,16 Kg/L
pH (sol. 1% V/V): 6,4

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Pomodoro in serre o tunnels - *Trattamenti localizzati sul grappolo* - ml 20-25 di PRIMO-fp in 10 litri di acqua. I trattamenti devono essere iniziati all'apertura dei primi fiori del primo palco florale e poi ripetuti ad intervalli di 2 giorni nei periodi caldi (>/=30°C) e di 3/6 giorni con temperature più miti (temperature comprese tra 25/15°C). Pomodoro da industria - ml 150-200 di PRIMO-fp per ettolitro di acqua. I trattamenti devono essere iniziati all'apertura dei primi fiori e ripetuti ogni 8/10 giorni fino a completa allegagione. Peperone - ml 150-200 di PRIMO-fp per ettolitro di acqua. I trattamenti devono essere iniziati all'apertura dei primi fiori e ripetuti ogni 8/10 giorni fino a completa allegagione. Fragola - ml 150-200 di PRIMO-fp per ettolitro di acqua. I trattamenti devono essere iniziati all'apertura dei primi fiori e ripetuti ogni 8/10 giorni fino a completa allegagione. Modalità di distribuzione su tutte le colture: *Distribuire la soluzione attraverso irrorazione fogliare bagnando omogeneamente la vegetazione.(impiegare 800-1000 litri di soluzione per ettaro).Per ottenere una buona allegagione è importante che la soluzione riesca ad arrivare sui fiori o sui grappoli fiorali.*

Confezione bottiglie da 1l, fusti da 5l